



umcg



Maastricht UMC+



Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam



UMC Utrecht

Handelingsschema 3 Volwassenen (HS 3)

Verzorging van het tracheostoma

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	<ul style="list-style-type: none"> • controleren van de huid rondom het tracheostoma en de rand van het tracheostoma • schoonmaken van de huid rondom het tracheostoma
Benodigdheden	<ul style="list-style-type: none"> • schoon werkveld • niet-steriele handschoenen • desinfectans • natte en droge niet-steriele gaasjes • wattenstokjes • schoon canulegaas (metaline- of splitgaas) • zo nodig schoon canulebandje • zo nodig huidbeschermingsmiddel • noodcanule, zoals voorgeschreven • handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel • afvalbakje
Werkwijze	<ol style="list-style-type: none"> 1. was of desinfecteer de handen 2. trek de niet-steriele handschoenen aan 3. maak een schoon werkveld 4. leg op het werkveld alle benodigdheden klaar 5. informeer de zorgvrager 6. vraag en/of help de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen 7. verwijder het canulegaasje 8. maak het canulebandje iets losser zodat je er onder kunt schoonmaken 9. licht de tracheacanule iets op zodat je onder het schildje kunt komen met een vochtig gaasje 10. maak de huid rondom het tracheostoma met een vochtig gaasje schoon en bekijk de rand van het tracheostoma en de huid rondom het tracheostoma 11. droog de huid rondom het tracheostoma met een droog gaasje en bescherm deze zo nodig met een huidbeschermingsmiddel, indien voorgeschreven

	<p>12. verwijder het canulebandje en houd met één hand de tracheacanule vast</p> <p>13. controleer de hals en nek op smetplekken en wondjes en maak deze schoon; droog de hals en nek goed</p> <p>14. breng een schoon canulebandje aan en laat wat ruimte om het canulegaas aan te brengen.</p> <p>15. breng een schoon canulegaas aan</p> <p>16. maak het canulebandje nu strakker vast. Er mag één vinger ruimte zijn tussen het canulebandje en de hals. Zorg dat het bandje gelijk is afgesteld. Let hierbij op dat de tracheacanule recht in het stoma zit</p> <p>17. controleer voordat je de zorgvrager alleen laat of hij/zij zich prettig voelt</p> <p>18. ruim de gebruikte spullen op</p> <p>19. trek de niet-steriele handschoenen uit</p> <p>20. was of desinfecteer de handen</p> <p>21. rapporteer de bijzonderheden volgens de afspraken binnen je eigen organisatie</p>
Aandachtspunten	<ul style="list-style-type: none"> • verzorging van het tracheostoma gebeurt minimaal 1x per dag; bij verontreiniging zo vaak als nodig. De frequentie van het wisselen van het canulebandje gebeurt volgens afspraak CTB of op verzoek zorgvrager • verzorging van het tracheostoma bij voorkeur door twee personen, de tracheacanule kan bij een los canulebandje uit het tracheostoma glijden