



umcg



Maastricht UMC+



Erasmus MC

Universitair Medisch Centrum Rotterdam



UMC Utrecht

## Observatieschaal 2 Volwassenen (OS 2)

### Beademen met een handbeademingsballon op een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

#### Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

#### **De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!**

	<b>De zorgverlener;</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>nvt</b>
	<b>Vorbereiding</b>				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties/complicaties				
	<b>Balloneren</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>nvt</b>
3.	zet de juiste materialen klaar handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel, desinfectans, niet steriele handschoenen				
4.	wast of desinfecteert de handen				
5.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
6.	<b>controleert of het overdrukventiel van de handbeademingsballon open staat</b>				
7.	informeert de zorgvrager				

8.	<b>opent de tracheacanule door:</b> • <b>de swivel los te maken van de tracheacanule</b>				
	<b>of</b> • <b>verwijdert spreekklep, afsluitdop, kunstneus</b>				
9.	<b>sluit de swivel van de handbeademingsballon aan op de tracheacanule</b>				
10.	<b>knijpt met twee handen rustig in de handbeademingsballon. Ongeveer 12 tot 16 keer per minuut, of zo vaak als zorgvrager aangeeft en kijkt of de borstkas omhoogkomt</b>				
11.	<b>let erop dat er voldoende tijd is voor de uitademing en de handbeademingsballon zich weer vult met lucht</b>				
12.	<b>beademt net zolang met de handbeademingsballon tot de beademing weer aangesloten kan worden is of tot de zorgvrager gestabiliseerd is of na afronden 'druppelen, balloneren en uitzuigen'</b>				
13.	<b>sluit de beademingsmachine weer aan of plaats een spreekklep, afsluitdop of kunstneus</b>				
14.	controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing				
15.	ruimt de gebruikte materialen op				
16.	trekt de niet-steriele handschoenen uit				
17.	wast of desinfecteert handen				
18.	rapporteert de bijzonderheden volgens afspraak binnen de eigen organisatie				

**Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:**

Alle **7 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 11 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 11 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

<b>Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties</b>	<b>Maximaal aantal onvoldoendes</b>
10	2
9	2
8	2
7	1
6	1

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: