

Observatieschaal 6 Volwassenen (OS 6)

Druppelen en balloneren via een tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt complicaties en aandachtspunten				
	Werkwijze druppelen en balloneren	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste materialen klaar: schoon werkveld, desinfectans, niet-steriele handschoenen, benodigdheden voor uitzuigen van de luchtwegen, handbeademingsballon met swivel, fysiologisch zout (NaCl 0,9%), 10 milliliterspuit, kraanwater, afvalbakje				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				

7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	opent de tracheacanule door: de swivel los te maken van de tracheacanule of verwijdert spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
10	onderdrukt het alarm van de beademingsmachine indien de zorgvrager wordt beademd. De beademing mag niet worden uitgezet tenzij dat is afgesproken				
11.	zuigt de tracheacanule indien nodig eerst uit				
12.	spuit de afgesproken hoeveelheid fysiologisch zout (NaCl 0,9%) in de tracheacanule				
13.	sluit de handbeademingsballon met swivel aan op de tracheacanule				
14.	knijpt met twee handen rustig in de ballon. Ongeveer 12 tot 16 keer per minuut, of zo vaak als zorgvrager aangeeft				
15.	zuigt de tracheacanule uit en herhaalt dit eventueel als er nog slijm zit				
16.	vraagt de zorgvrager of het slijm naar zijn/haar gevoel verdwenen is				
17.	sluit de tracheacanule door de beademingsmachine aan te sluiten of plaatst de spreekklep, de afsluitdop of kunstneus				
18.	controleert of de zorgvrager zich prettig voelt				
19.	ruimt de gebruikte materialen op				
20.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
21.	wast of desinfecteert handen				
22.	rapporteert de bijzonderheden volgens afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 7 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 15 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 15 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
14	3
13	3
12	2
11	2
10	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: