

Observatieschaal 11 Volwassenen (OS 11)

Wisselen van een tracheacanule met cuff

Categorie: voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

| | De zorgverlener: | 1 | 2 | 3 | nvt |
|----|--|----------|----------|----------|------------|
| | Vorbereiding | | | | |
| 1. | benoemt doel van de handeling | | | | |
| 2. | benoemt de indicaties | | | | |
| 3. | benoemt complicaties | | | | |
| | Verwisselen van een tracheacanule met cuff | 1 | 2 | 3 | nvt |
| 4. | zet de juiste spullen klaar: schoon werkveld, niet-steriele handschoenen, desinfectans, handbeademingsballon met swivel, spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen, schone tracheacanule, noodcanule, schoon canulegas (metaline- of splitgas), canulebandje, 10 milliliter spuit, zo nodig flacon steriel water glijmiddel of (kraan) water, opvangbakje, afvalbakje, droge en natte niet-steriele gazen, huidbeschermingsmiddelen indien afgesproken | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 5. | wast of desinfecteert de handen | | | | |
| 6. | trekt de niet-steriele handschoenen aan | | | | |
| 7. | maakt een schoon werkveld | | | | |
| 8. | legt alle spullen op het werkveld klaar | | | | |
| 9. | informeert de zorgvrager | | | | |
| 10. | vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen | | | | |
| 11. | zorgt dat de handbeademingsballon binnen handbereik ligt | | | | |
| 12. | controleert vooraf de onderdelen van de schone tracheacanule op mogelijke beschadigingen. Let ook op de maat en type tracheacanule | | | | |
| 13. | test de cuff met de afgesproken hoeveelheid lucht en controleert de cuff op een mogelijk lek, zuigt vervolgens de cuff volledig leeg | | | | |
| 14. | verwijdert binnencanule uit de schone tracheacanule en plaatst de voeder in de tracheacanule, indien geen binnencanule aanwezig, plaats de voeder in de tracheacanule | | | | |
| 15. | maakt het canulebandje aan een kant van de schone tracheacanule vast | | | | |
| 16. | brengt glijmiddel aan op de schone tracheacanule (in plaats van glijmiddel mag ook (kraan) water worden gebruikt) | | | | |
| 17. | zuigt voorafgaand aan de canulewissel de luchtwegen via de tracheacanule uit | | | | |
| 18. | vraagt aan de zorgvrager of hij/zij kan starten met het wisselen van de tracheacanule | | | | |
| 19. | verwijdert het canulegaasje en maakt het canulebandje aan één kant los | | | | |
| 20. | maakt de 10 milliliter spuit vast aan het ventiel van de cufflijn | | | | |
| 21. | maakt de beademing, indien aanwezig, los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm, indien de zorgvrager niet wordt beademd, verwijder spreekdop, kunstneus of afsluitdop | | | | |
| 22. | leegt cuff | | | | |
| 23. | verwijdert tracheacanule uit het tracheostoma, met kantelende beweging naar de tenen | | | | |
| 24. | legt de gebruikte tracheacanule in het opvangbakje | | | | |
| 25. | maakt de huid rondom het tracheostoma op juiste wijze schoon en controleert het tracheostoma | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 26. | behandelt indien afgesproken granulatieweefsel of brengt huidbeschermingsmiddel aan | | | | |
| 27. | brengt de schone tracheacanule met voerder in met een vloeiende beweging richting de tenen, via het tracheostoma in de luchtpijp | | | | |
| 28. | verwijdert direct voerder en plaatst binnencanule, indien aanwezig | | | | |
| 29. | sluit indien nodig de beademing direct aan. Indien de zorgvrager niet wordt beademd, plaats dan spreekklepje, afsluitdop of kunstneus | | | | |
| 30. | maakt het canulebandje vast aan de tracheacanule | | | | |
| 31. | vult de cuff met behulp van een 10 milliliter spuit met de afgesproken hoeveelheid lucht of steriel water. Gebruik nooit een spreekklep of afsluitdop bij een gevulde cuff | | | | |
| 32. | plaatst een schoon canulegaasje en maak het canulebandje nu strakker vast. | | | | |
| 33. | controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing of met spreekklep, afsluitdop of kunstneus | | | | |
| 34. | ruimt de gebruikte spullen op | | | | |
| 35. | gooit de vuile tracheacanule weg, of reinigt de tracheacanule volgens voorschrift | | | | |
| 36. | trekt niet steriele handschoenen uit | | | | |
| 37. | wast of desinfecteert handen | | | | |
| 38. | rapporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie | | | | |

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 16 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 22 items mogen er maximaal 4 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 22 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

| Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties | Maximaal aantal onvoldoendes |
|---|-------------------------------------|
| 21 | 4 |
| 20 | 4 |
| 19 | 4 |
| 18 | 4 |
| 17 | 3 |
| 16 | 3 |
| 15 | 3 |

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: