

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
U krijgt drukplekken van het masker	<ul style="list-style-type: none"> - masker zit te strak - uw huid moet nog wennen aan het masker en wat steviger worden 	<ul style="list-style-type: none"> - de hoofdbanden van het masker zo mogelijk wat losser zetten - voor het opzetten van het masker huid beschermend materiaal aanbrengen bij Mepilex lite of Compeed bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door u of uw zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - bij eerste tekenen van roodheid beginnen met huid beschermende materiaal bijv Mepilex lite of compeed. - nb. bij blaarvorming of kapotte huid direct de eerstvolgende werkdag naar het CTB bellen
Uw ogen zijn rood of ontstoken	<ul style="list-style-type: none"> - masker zit te los waardoor lucht in de ogen blaast 	<ul style="list-style-type: none"> - de hoofdbanden van het masker strakker aantrekken - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door u of uw zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - bellen tijdens het eerstvolgende verpleegkundige spreekuur
U hebt last van een bloedneus	<ul style="list-style-type: none"> - te droge lucht - gevoelig slijmvlies 	<ul style="list-style-type: none"> - neus goed snuiten en daarna 10 minuten bovenaan dichtdrukken - bevochtiger hoger zetten - neus druppelen met Nacl 0,9 % - als het blijft bloeden de huisarts bellen 	<ul style="list-style-type: none"> - door u of uw zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - als na een half uur het bloeden niet stopt de (dienstdoende) huisarts bellen

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
U hebt last van een opgeblazen gevoel, u moet veel boeren of winden laten	- de lucht van de beademingsmachine blaast gedeeltelijk de maag in	- proberen te boeren of winden te laten - 's morgens goed rechtop zitten en een glas koolzuurhoudende drank drinken om te kunnen opboeren - als u een PEG heeft kunt u deze gebruiken om te ontlichten - overleggen met het CTB	- door uzelf of uw zorgverlener	- elke morgen direct na het stoppen van de beademing - bellen tijdens het eerstvolgend verpleegkundig spreekuur
U hebt veel slijmvorming en koorts en/of u voelt zich benauwd	- u kunt een beginnende luchtweginfectie hebben	- beademingsuren uitbreiden - extra airstacken (ophoesten door middel van lucht stapelen) - huisarts als eerste bellen daarna kunt u ook overleggen met het CTB	- door uzelf of uw zorgverlener	- dezelfde dag
U bent heel erg benauwd	- problemen met de longen of het hart	- goed rechtop gaan zitten - beademingsuren uitbreiden - dienstdoende huisarts bellen - bij calamiteiten 112 bellen	- door uzelf, uw hulpverlener of huisarts	- direct
U hebt klachten: hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieproblemen	- het kan zijn dat uw beademingsmachine niet meer optimaal staat	- overleggen met het CTB	- door uzelf of uw zorgverlener	- bellen tijdens het eerstvolgend verpleegkundig

	ingesteld - de ademhaling schiet tekort			spreekuur
--	---	--	--	-----------