



Handelingsschema kind 10

Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma (thuis)

Categorie: Voorbehouden handeling

Doel	• doorgankelijkheid van de trachea en het tracheostoma behouden zodat ademen spreken, beademen en ongecompliceerd wisselen van de tracheacanule mogelijk blijft • preventie van bloedingen van het granulatieweefsel • preventie van infectie van het tracheostoma
Benodigdheden	• niet steriele handschoenen • kraanwater om mee te reinigen • natte en droge niet-steriele gazen • zilvernitraatstokje voor eenmalig gebruik • reserve tracheacanule en noodtracheacanule • schoon tracheacanulegaas en tracheacanulebandje volgens voorschrift • huidbeschermingsmiddel • opvang- en afvalbakje
Werkwijze	Er zijn twee personen nodig om deze behandeling te verrichten 1. was of desinfecteer de handen en trek de niet steriele handschoenen aan 2. instrueer het kind, indien mogelijk 3. plaats het kind in de gewenste houding (of vraag het kind de gewenste houding in te nemen) 4. maak het tracheacanulebandje indien nodig iets losser 5. verwijder het tracheacanulegaasje 6. trek de tracheacanule, indien nodig een klein stukje terug om bij het granulatieweefsel te kunnen 7. reinig de rand van het tracheostoma met een vochtig gaasje en droog de huid 8. bescherm de omringde huid met een huidbeschermingsmiddel, volgens afspraak 9. maak de tip van het zilvernitraatstokje nat met kraanwater. Stip het granulatieweefsel aan tot het granulatieweefsel wit/grijs verkleurt (let op: het aangestipte weefsel kan gaan bloeden). 10. breng een schoon tracheacanulegaas aan

	11. breng het tracheacanulebandje zo strak aan dat tussen de huid van de hals en het tracheacanulebandje nog één vingerbreedte ruimte overblijft 12. ruim de gebruikte verontreinigde materialen op, trek de handschoenen uit en was of desinfecteer de handen
Aandachtspunten	• zilvernitraat wordt voorgeschreven door een arts, deze geeft ook de frequentie en duur van de behandeling aan • gebruik kant-en-klare zilvernitraatstokjes. Vanuit het CTB adviseren we om geen zilvernitraatstift te gebruiken, omdat deze kan breken en er een etsende verbranding op gezond weefsel kan ontstaan • let op, dat de huid rond het tracheostoma en de eigen vingers niet in contact komen met zilvernitraat: het is een etsende stof • behandel alleen granulaties ter hoogte van de tracheostomarand en NIET eventueel aanwezige granulaties in de trachea zelf • als het granulatieweefsel in de aanbevolen behandel frequentie niet verdwijnt, is een nieuw consult bij de KNO-arts noodzakelijk