

Problemen met maskerbeademing bij kinderen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Het kind krijgt drukplekken van het masker	<ul style="list-style-type: none"> - masker zit te strak - de huid moet nog wennen aan het masker en wat steviger worden 	<ul style="list-style-type: none"> - de hoofdbanden van het masker zo mogelijk wat losser zetten - voor het opzetten van het masker één laag huidbeschermer bv. Mepilex lite® aanbrengen - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - bij eerste tekenen van roodheid beginnen met een huisbeschermer bv. Mepilex lite® - nb. bij blaarvorming of kapotte huid direct de eerstvolgende werkdag naar het CTB bellen
De ogen zijn rood of ontstoken	<ul style="list-style-type: none"> - masker zit te los waardoor lucht in de ogen blaast 	<ul style="list-style-type: none"> - de hoofdbanden van het masker strakker aantrekken. Controleer of de banden aan beide zijden op gelijke afstand zijn afgesteld. - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - bellen tijdens het eerstvolgende verpleegkundige spreekuur
Het kind heeft last van een bloedneus	<ul style="list-style-type: none"> - te droge lucht - gevoelig slijmvlies 	<ul style="list-style-type: none"> - neus goed snuiten en daarna 10 minuten bovenaan dichtdrukken - bevochtiger hoger zetten - neus druppelen met NaCl 0,9 % - als het blijft bloeden de huisarts bellen 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - als na een half uur het bloeden niet stopt de (dienstdoende) huisarts bellen

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Het kind heeft last van een verstopte neus.	<ul style="list-style-type: none"> - te droge lucht - gevoelig slijmvlies 	<ul style="list-style-type: none"> - bevochtiger hoger zetten - neus druppelen met NaCl 0,9 % - Xylometazoline neusdruppels, max. 5 dagen geven - overleggen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - zo snel mogelijk - bellen tijdens het eerstvolgend verpleegkundig spreekuur
Het kind heeft veel slijmvorming en koorts en/of voelt zich benauwd	<ul style="list-style-type: none"> - kan een beginnende luchtweginfectie zijn 	<ul style="list-style-type: none"> - beademingsuren uitbreiden - extra airstacken (ophoesten door middel van luchtstapelen) - huisarts als eerste bellen daarna kunt u ook overleggen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - dezelfde dag
Het kind is heel erg benauwd	<ul style="list-style-type: none"> - problemen met de longen of het hart 	<ul style="list-style-type: none"> - goed rechtop gaan zitten - beademingsuren uitbreiden - dienstdoende huisarts bellen - bij calamiteiten 112 bellen 	<ul style="list-style-type: none"> - door hulpverlener of huisarts 	<ul style="list-style-type: none"> - direct
Het kind heeft klachten: hoofdpijn, vermoeidheid of concentratieproblemen	<ul style="list-style-type: none"> - het kan zijn dat de beademingsmachine niet meer optimaal staat ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> - overleggen met het CTB 	<ul style="list-style-type: none"> - door zorgverlener 	<ul style="list-style-type: none"> - bellen tijdens het eerstvolgend verpleegkundig spreekuur

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Het kind heeft last van een opgeblazen gevoel en moet veel boeren of winden laten	- de lucht van de beademingsmachine blaast gedeeltelijk de maag in	- proberen te boeren of winden te laten - 's morgens goed rechtop zitten en een glas koolzuurhoudende drank drinken om te kunnen opboeren - als het kind een PEG heeft kan deze gebruikt worden om te ontlichten - overleggen met het CTB	- door zorgverlener	- elke morgen direct na het stoppen van de beademing - bellen tijdens het eerstvolgend verpleegkundig spreekuur
Het kind heeft last van een droge mond	- de luchtstroom droogt de slijmvliezen uit	- stand elektrische bevochtiger verhogen - slokje water geven als het kind zich niet verslikt.	- door zorgverlener	- direct
Condens in slang en/of masker	- bevochtiger te warm afgesteld.	- stand elektrische bevochtiger verlagen	- door hulpverlener	- direct