

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Er is sprake van drukplekken door het beademingsmasker	- beademingsmasker zit te strak - de huid moet nog wennen aan het beademingsmasker	- de hoofdbanden van het beademingsmasker zo mogelijk wat losser zetten - voor het opzetten van het beademingsmasker huid-beschermend materiaal aanbrengen bijv Mepilex lite of Compeed - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB	- door zorgvrager of zorgverlener	- bij eerste tekenen van roodheid beginnen met huid-beschermend materiaal - bij blaarvorming of beschadigde huid de eerstvolgende werkdag bellen naar het verpleegkundig spreekuur van het CTB
De ogen zijn rood of ontstoken	- beademingsmasker zit te los waardoor lucht in de ogen blaast	- de hoofdbanden van het beademingsmasker strakker aantrekken - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB	- door zorgvrager of zorgverlener	- bellen tijdens het eerstvolgende werkdag bellen naar het verpleegkundig spreekuur van het CTB
Er is sprake van een bloedneus	- te droge lucht - gevoelig slijmvlies	- neus goed snuiten en daarna 10 minuten bovenaan dichtdrukken- - stand van de bevochtiger hoger zetten - neus druppelen met fysiologisch zout (NaCl 0,9 %)	- door zorgvrager of zorgverlener	- als na een half uur het bloeden niet stopt de huisarts bellen

Problemen met maskerbeademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Er is sprake van een opgeblazen gevoel, de zorgvrager moet veel boeren of winden laten	- de lucht van de beademingsmachine blaast gedeeltelijk de maag in	- proberen te boeren of winden te laten - 's morgens, gelijk na stoppen beademing, goed rechtop zitten en een glas koolzuurhoudende drank drinken om te kunnen opboeren - als de zorgvrager een PEG sonde heeft, kan deze gebruikt worden om te ontluchten - bij blijvende problemen contact opnemen met het CTB	- door zorgvrager of zorgverlener	- de eerstvolgende werkdag bellen naar het verpleegkundig spreekuur van het CTB
Er is sprake van veel slijmvorming en koorts en/of benauwdheid	- er kan sprake zijn van een beginnende luchtweginfectie	- beademingsuren uitbreiden - extra airstacken (ophoesten door middel van lucht stapelen) - huisarts als eerste bellen daarna eventueel ook overleggen met het CTB	- door zorgvrager of zorgverlener	- dezelfde dag
Er is sprake van de volgende klachten: hoofdpijn, vermoeidheid en/of concentratieproblemen	- de beademingsmachine is niet meer goed ingesteld	- overleggen met het CTB	- door zorgvrager of zorgverlener	- eerstvolgende werkdag bellen naar het verpleegkundig spreekuur van het CTB

