

Observatieschaal kind 09B

Vullen en legen van de cuff bij een kind met een gecuffte tracheacanule

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist:
Organisatie:
Naam beoordelaar:
Datum:

Beoordelingscriteria

- **Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.
- **Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.
- **Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.
- **Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt de redenen van de handeling				
3	benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling zeker benoemen: NOOIT spreekklep bij opgeblazen cuff				
	Het legen van de cuff				
4	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
5	zet de spullen die nodig zijn klaar				

6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en helpt het kind in de goede houding				
7	zuigt als het nodig is de tracheacanule en of de mond- keelholte uit voor het legen van de cuff				
8	maakt, als het kind beademd wordt, de swivel los van de tracheacanule en onderdruk het alarm van de beademingsmachine. De beademing mag niet worden uitgezet behalve als dat is afgesproken.				
9	verwijdert het bevochtigingsfilter, als het kind niet wordt beademd				
10	plaatst de 10 milliliter spuit op het ventiel van de cuff-lijn				
11	trekt met de spuit de cuff leeg en controleert de hoeveelheid!				
12	zuigt tijdens of vlak na het leegmaken van de cuff de tracheacanule uit				
13	zet het bevochtigingsfilter of spreekklep weer op de tracheacanule of sluit de beademing weer aan				
14	controleert of de beademingsmachine op het juiste programma staat, als het kind wordt beademd				
15	zuigt de tracheacanule nog een keer uit als dat nodig is				
16	controleert de ademhaling en kijkt of het kind zich prettig voelt				
17	ruimt de gebruikte spullen op				
18	trekt de handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven) en wast of desinfecteert de handen				
19	schrijft de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				
	<i>Het vullen van de cuff</i>				
20	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
21	zet de spullen die nodig zijn klaar				
22	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en helpt het kind in de goede houding				
23	controleert of de beademingsmachine op het juiste programma staat, als het kind wordt beademd				
24	vult de 10 milliliter spuit met de afgesproken hoeveelheid lucht of water				
25	verwijdert de spreekklep of het bevochtigingsfilter als die wordt gebruikt				
26	plaatst de 10 milliliter spuit op het ventiel van de cuff-lijn				

27	vult de cuff van de tracheacanule met de afgesproken hoeveelheid lucht of water				
28	sluit de beademing weer aan of zet het bevochtigingsfilter weer op de tracheacanule				
29	controleert de ademhaling en kijk of het kind zich prettig voelt				
30	ruimt de gebruikte spullen op				
31	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven), en wast of desinfecteert de handen				
32	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen.

Het resultaat is voldoende als:

Alle **8 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 24 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 24 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden onderstaande regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
24	4
23	4
22	3
21	3
20	2