

## Handelingsschema kind 10

### Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma bij een kind

Categorie: Voorbehouden handeling

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doel          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• verwijderen van granulatieweefsel</li> <li>• zorgen dat het tracheostoma open blijft</li> <li>• een tracheacanule kunnen wisselen zonder problemen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benodigdheden | <ul style="list-style-type: none"> <li>• schoon werkveld</li> <li>• niet-steriele handschoenen</li> <li>• desinfectans</li> <li>• natte en droge niet-steriele gaasjes of wattenstokjes</li> <li>• zilvernitraat, voor eenmalig gebruik</li> <li>• noodtracheacanule</li> <li>• handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel</li> <li>• schoon tracheacanulegaas</li> <li>• huidbeschermingsmiddel, volgens afspraak</li> <li>• afvalbakje</li> <li>• noodset</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Werkwijze     | <p>deze handeling wordt bij voorkeur door twee personen verricht:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. was of desinfecteer de handen</li> <li>2. trek de niet-steriele handschoenen aan</li> <li>3. maak een schoon werkveld</li> <li>4. leg alle spullen op het werkveld klaar</li> <li>5. vertel het kind, als dat kan, wat je gaat doen</li> <li>6. vraag en/of help het kind in de goede houding</li> <li>7. maak het tracheacanulebandje, als het nodig, iets losser</li> <li>8. verwijder het tracheacanulegaas</li> <li>9. trek de tracheacanule, als het nodig is, een beetje terug om het granulatieweefsel om het tracheostoma goed te kunnen zien</li> <li>10. maak de huid rondom het tracheostoma met een vochtig gaasje of wattenstokje schoon</li> <li>11. droog de huid rondom het tracheostoma met een droog gaasje of wattenstokje</li> </ol> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>12. breng huidbeschermingsmiddel aan op de gezonde huid</p> <p>13. maak de punt van het zilvernitraatstokje een beetje vochtig, maar zorg ervoor dat het niet te nat wordt of druipt</p> <p>14. stip het granulatieweefsel voorzichtig aan met het stokje, totdat het grijs wordt. <b>Let op:</b> Zorg ervoor dat je het gezonde weefsel niet raakt.</p> <p>15. draai het stokje steeds, om het zilvernitraat gelijkmatig op het granulatieweefsel aan te brengen</p> <p>16. leg het zilvernitraatstokje, nadat je het gebruikt hebt, op een droog niet-steriel gaas</p> <p>17. breng een schoon tracheacanulegaas aan</p> <p>18. maak het nieuwe tracheacanulebandje zo strak vast dat er nog één vinger tussen hals en tracheacanulebandje past</p> <p>19. vraag het kind of het zich prettig voelt</p> <p>20. ruim de gebruikte spullen op</p> <p>21. trek de niet-steriele handschoenen uit</p> <p>22. was of desinfecteer de handen</p> <p>23. schrijf de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen je eigen organisatie</p> |
| Aandachtspunten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zilvernitraat wordt voorgeschreven door een arts, die aangeeft hoe vaak en hoe lang het gebruikt moet worden</li> <li>• gebruik kant-en-klare zilvernitraatstokjes. Het CTB adviseert geen zilvernitraatstiften te gebruiken, omdat deze kunnen breken en verbranding op gezond weefsel kunnen veroorzaken.</li> <li>• let op, dat de huid rond het tracheostoma en de eigen vingers niet in contact komen met zilvernitraat, omdat zilvernitraat de huid kan beschadigen</li> <li>• granulatieweefsel is kwetsbaar weefsel en kan snel gaan bloeden</li> <li>• tijdens het aanstippen zal het weefsel wit/grijs verkleuren (dit is necrotisch granulatieweefsel en kan gaan bloeden)</li> <li>• als het granulatieweefsel na de afgesproken behandel tijd niet verdwijnt, moet er een nieuwe afspraak bij de behandelend arts worden gemaakt</li> <li>• als het zilvernitraatstokje is gebruikt gooi je hem weg bij het chemisch afval</li> </ul>                                              |