

Observatieschaal kind 26**Zuurstof toedienen bij kinderen met een tracheacanule**

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Zuurstof toedienen bij kinderen met een tracheacanule				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeert het kind				
8.	Sluit een saturatiemonitor aan indien voorgeschreven				
9.	Plaast een bevochtigingsfilter of spreekklep met zuurstofaansluiting op de tracheacanule				
10.	Bevestigt de zuurstofverbindingsslang op de zuurstofbron en vervolgens op de tracheacanule.				
11.	Zet de zuurstof bron aan en geeft de voorgeschreven hoeveelheid zuurstof				

12.	Observeert het kind en geeft de zuurstof volgens voorschrift arts of CTB.				
-----	---	--	--	--	--

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 4 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 8 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 8 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
7	1
6	1

umcg:

