

Observatieschaal kind 27**Beademen met een handbeademingsballon bij kinderen met een tracheacanule**

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt het doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s)				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Verzorging van het tracheastoma bij kinderen				
4.	Wast of desinfecteert de handen				
5.	Trekt de niet steriele-handschoenen aan				
6.	Controleert of het overdrukventiel open is				
7.	Informeert het kind indien mogelijk en legt het kind in de gewenste houding. Jonge kinderen plat leggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen bij ouderen kinderen kan de verzorging ook zittend				
8.	Verwijdt het bevochtigingsfilter, de spreekklep of afsluitdop van de tracheacanule				

9.	Plaatst de handbeademingsballon, eventueel met swivel, op de tracheacanule.				
10.	Knijpt rustig in de handbeademingsballon. Hiermee wordt lucht in de longen van het kind geblazen en zie je de borstkas omhoogkomen. Houdt hierbij rekening met de normale ademhalingsfrequentie van het kind				
11.	Tussen de ademdeugen moet voldoende tijd zijn zodat de ballon zich weer kan vullen met lucht				
12.	Beademt net zolang met de handbeademingsballon tot het kind zelfstandig kan ademen of er hulpdiensten aanwezig zijn die het kunnen overnemen				
13.	Als ondersteunen van de ademhaling niet meer nodig is:				
14.	Koppelt de swivel en handbeademingsballon los van de tracheacanule. Plaats een bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop op de tracheacanule				
15.	Observeert of het kind comfortabel is en zelfstandig blijft ademen				
16.	Ruimt de gebruikte materialen op				
17.	Trekt de niet steriele handschoenen uit en was of desinfecteert de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 6 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 11 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
10	2
9	2
8	2
7	1
6	1